

IB 1189

Vass5R04s356-360



INRA

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1912

5R4s356-360
IB 1189
0Mtp1912

0Mtp1912

Date : 23.06 2014
Personne : SP
Nb feuille : 4

INRA Colmar IB 1189

IB 1189

Vass5R04s351-355

Vass5R04s356-360







Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 3730 Observateur :
CodeVar : 0 CodeIntro : 0Mtp1912 NomVar : Cépage non identifié
Nom introduction : IB 1189 Emplacement : Vass5R04s351-355

PHENOLOGIE

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---------|---|--------------|------------|----------|-------------|--------------|
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne | Jaune | Rougeâfr e | Rouge | Rouge foncé | rouge violet |

VIGUEUR ET CROISSANCE

| | | | | | | |
|---------|---|------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison) | très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | Absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

RESISTANCE

| | | | | | | |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| Oiv 459 | Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe | | très faible ou faible | moyenne | | élevée ou très élevée |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | | 29/3 | 4 | |
| 2 | 3 | | 27/3 | 5 | |
| 3 | 4 | | 27/3 | 8 | |
| 4 | 3 | | 27/3 | 4 | |
| 5 | 5 | | 27/3 | 6 | |
| Moyenne | 19 | | 27/3 - 1 | 27 | 14 |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 25.05 | 29.05 0 | | 18.07 3. bourgeons | 30.07 +1 | 2-08 | |

SUIVI DE MATURE

| Dates | 20.08 | 30.08 | | 06.09 | | | |
|------------------|---------|-----------------------|--|------------------|--------------|--|--|
| IR | 15.17.6 | Acide, pourriture 20% | | maturité avancée | baies folies | | |
| Valeur papier PH | | | | mais tj Acide | | | |

Remarque : Très grande MV le 26.07 Ravier Lundi 29.07 ±HV
Filets posés 30.07

CouPN
Sav N (30.08)
pip. oui Revu ok



Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 3730 Observateur :
CodeVar : 0 CodeIntro : 0Mtp1912 NomVar : Cépage non identifié
Nom introduction : IB 1189 Emplacement : Vass5R04s356-360

| PHENOLOGIE | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|----------|-------------|--------------|
| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce | Moyenn e | tardive | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne | Jaune | Rougeâtr e | Rouge | Rouge foncé | rouge violet |

| VIGUEUR ET CROISSANCE | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison) | très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | Absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

| RESISTANCE | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| Oiv 459 | Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe | | très faible ou faible | moyenne | | élevée ou très élevée |

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 15 | | | | |
| 2 | 4 | 27/3 | 29/3 | 10 | |
| 3 | 4 | | 27/3 | 8 | |
| 4 | 2 | | 26/3 | 5 | |
| 5 | 4 | | 26/3 | 8 | |
| Moyenne | 14 | | 27/3 -1 | 31 | 22 |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 25-05 | 25-05 0 | | 24-07 | 01-08 +1 | 02-09 | |

| SUIVI DE MATURITE +2 | | | | | | | |
|----------------------|---------|-------|-----------------------|--|--|--|--|
| Dates | 26-08 | 30-08 | 06-09 | | | | |
| IR | 13.50 A | Aide | 13.50 A | | | | |
| Valeur papier PH | | | les baies flétrissent | | | | |

Remarque : 1 08. → 28 dets

Coul N
Sav N (30-08) pas ok
pépin Ovi

Formulaire description 4 / 8 (nouaison-véraison)

Nom variété / introduction

161189

Observateur - Date

CM 9/8/2018

Code var / intro

ONkp 1912

Emplacement

Vassal 351-355

Remarques

forte altoge mildiou
limbe très épais

| LIMBE | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Code OIV | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 065 = 17 | Taille du limbe | très petite | petite | moyenne | grande | très grande |
| 067 = 18 | Forme du limbe | 1-cordiforme | 2-cunéiforme | 3-pentagon. | 4-orbicul. | 5-rénif. |
| 068 = 20 | Nombre de lobes | 1-F. entière | 2-trois | 3-cinq | 4-sept | 5- + de sept |
| 069 | Couleur face supérieure limbe | | vert clair | vert moyen | vert foncé | |
| 070 = 27 | Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face supérieure du limbe | 1- nulle | 2- seulement au point pétiole | 3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc. | 4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc. | 5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc |
| 071 | Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face inférieure du limbe | 1- nulle | 2- seulement au point pétiole | 3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc. | 4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc. | 5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc |
| 074 | Profil du limbe | 1-plan | 2-en V | 3-involuté | 4-révoluté | 5-tourmenté |
| 073 | Ondulation du limbe (entre nervures I ou II) | absente | | | | présente |
| 072 | Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II) | absente ou t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 075 = 19 | Cloûre de la face sup. du limbe (entre nerv. dernier ordre) | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 084 = 28 | Densité p. couchés entre nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 085 | Densité p. dressés entre nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 086 | Densité p. couchés des nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 087 = 29 | Densité p. dressés des nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 088 | Villosité couchée nerv.principales face sup | absente | | | | présente |
| 089 | Villosité dressée nerv. principales face sup | absente | | | | présente |
| 000-44 | Densité p. couchés limbe face sup. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 000-45 | Densité p. dressés limbe face sup. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |

| PETIOLE | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|--------------------|---------|------------------|------------|
| 090 | Densité poils couchés sur le pétiole | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 091 | Densité poils dressés sur le pétiole | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 093 = 30 | Longueur pétiole p/r nervure médiane | plus court | légér. plus court | égal | légér. plus long | plus long |
| 000-06 | Couleur du pétiole | 1- coloré | 2- partiel. coloré | 3- vert | | |

| SINUS PETIOLAIRE (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7) | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 079 = (23) | Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiole | très ouvert | ouvert | fermé | chevauchant | très chev. |
| | +ocvv | très larg. ouvert | demi-ouvert | peu ouvert | légér. chev. | très fort. chev |
| 080 | Forme de la base du sinus pétiole | 1- en U | 2- en accolade | 3- en V | | |
| 081-1 | Dent dans la sinus pétiole | absents | | | | présents |
| 081-2 | Base du sinus pétiole limité par la nervure | 1- non limité | 2- sur un côté | 3- sur les deux côtés | | |

| SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7) | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 082 = (22) | Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs | 1- ouverts | 2- fermés | 3- légèrement chevauchants | 4- très chevauchants | 5- absence de sinus |
| 094 = 21 | Profondeur des sinus latéraux supérieurs | absence ou très peu profond | peu profond | moyens | profonds | très profonds |
| 083-1 | Forme de la base des sinus latéraux supérieurs | 1- en U | 2- en accolade | 3- en V | | |
| 083-2 | Dent dans les sinus latéraux supérieurs | absentes | | | | présents |

| DENTS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7) | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 076 = 26 | Forme des dents | 1- à deux côtés concaves | 2- à deux côtés rectilignes | 3- à deux côtés convexes | 4- un c. concaves, un c. convexes | 5- mélange notation 2 et notation 3 |
| 077 = ((24)) | Taille des dents par rapport à la taille du limbe | très petites | petites | moyennes | grandes | très grandes |
| 078 = 25 | Longueur des dents par rapport à leur largeur | très courtes | courtes | moyennes | longues | très longues |

| AUTRE CARACTÈRE OBSERVABLE A CETTE PERIODE | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Oiv 501 | Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.) | très faible (<10%) | faible (11-30%) | moyen (31-50%) | élevé (51-70%) | très élevé (>80%) |
| 303 = 31 | Epoque de début de véraison | très précoce | précoce | moyenne | tardive | très tardive |

INRA Vassal

Codes OIV 2009 (= OCVV 2013)

Codes 000-internes

Virus ENR

Virus CN

Autre

Mildiou

Oïdium

Botrytis

F = 7 ; I = 5

Esca

Eutypiose

Excrosiose

Chlorose

Carence Mg

Autre

2 tailles alternant